



藥物成分

劑型

編號

Nimodipine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

腦妥膜衣錠 30 毫克/錠 (Nimotop F.C.)

☞ 藥品作用

預防、治療蜘蛛膜下出血後，腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損。

☞ 服用方式

1. 通常每日 6 次，每次 2 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否曾對此類藥物過敏或是有其他疾病，特別是有低血壓(收縮壓小於 100mmHg)、心絞痛、四周內心肌梗塞、肝臟等疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是與 rifampicin、phenobarbital、phenytoin 和 carbamazepine、erythromycin、fluoxetine、ketoconazole、cimetidine、ritonavir。
3. 服藥時應避免同時攝取葡萄柚/葡萄柚汁。
4. 少數人服用本藥可能會暈眩或有姿勢性低血壓的副作用，如果從躺臥/坐姿要起立時應加小心，不要太快避免暈眩，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械。
5. 常見副作用為頭痛、頭暈、面部潮紅、皮膚紅疹、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：昏厥、呼吸困難、血壓顯著地降低、心跳不規則。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。