



藥物成分

劑型

編號

Irbesartan

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

安普諾維膜衣錠 300 毫克/錠 (Aprovel F.C.)

爾本沙丁膜衣錠 300 毫克/錠 (Irbesartan Sandoz F.C.)

## ☞ 藥品作用

本藥用來治療高血壓，且可治療高血壓併有糖尿病患者的糖尿病性腎病變。

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是有腎臟、肝臟疾病；準備懷孕或哺乳。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是其他降血壓劑、aliskiren、amiodarone、lithium、fluconazole、保鉀利尿劑、鉀離子補充劑、麻黃、非類固醇抗發炎止痛劑。
3. **本藥物含有乳糖**，若有罕見遺傳性半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏或葡萄糖-半乳糖吸收不良的患者請先諮詢醫師。
4. 請避免吃過量高鉀食品，若要使用低鈉鹽請事先諮詢醫師。
5. 如有需全身麻醉手術，請事先告訴醫師正在服用此藥。
6. 常見副作用為頭痛、頭暈、乾咳、疲勞、腸胃不適、腹瀉、姿勢性低血壓(坐臥姿變換站姿時易頭暈)、血管性水腫(常見於眼唇腫起來)，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：意識混亂，心跳不規律，呼吸急促(以上可能是血鉀過高造成)、過敏反應(皮膚疹、舌頭喉嚨腫起來、搔癢或蕁麻疹)、水腫、排尿量改變。
8. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，由於尚未建立哺乳期間使用資料，不建議用於哺乳期間。