

藥物成分

劑型

編號

Fenofibrate

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

弗尼利脂寧膜衣錠 160 毫克/錠 (Lipanthyl Supra F.C.)

祛脂優錠 160 毫克/錠 (Fenolip-U)

☞ 藥品作用

用來治療高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症、混合型高血脂症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 粒，與主餐併服。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝、腎功能不良、膽結石、懷孕及授乳的婦女。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服抗凝血藥、Cyclosporin、女性荷爾蒙或口服避孕藥、其他治療高血脂的藥。
3. 服藥初期建議每 3-6 個月檢測一次肝功能，長期使用約每 6-12 個月追蹤一次。
4. 可能會增加曬太陽產生的過敏(如:紅疹)，服藥期間請避免過度曝曬，並注意防曬措施。
5. 常見副作用為腸胃不適、腹痛、噁心、腹瀉、紅疹、搔癢、肌肉痠痛，但一般不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：若出現眼睛/皮膚變黃、茶色尿液(黃疸)、右上腹劇痛、不明原因的肌肉疼痛、肌炎、肌肉痙攣、無力，尤其伴有全身不適、虛弱或發燒的現象。
7. 懷孕女性慎用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥會分泌至乳汁中，不建議哺乳時使用。