



藥物成分

劑型

編號

Labetalol

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

湍泰低錠 200 毫克/錠 (Trandate)

☞ 藥品作用

本藥主要作用在減輕心臟的負荷，治療高血壓、心律不整及預防心絞痛。

☞ 服用方式

1. 通常一日 2 次，每次半~2 粒。
2. 不受食物影響，空腹或與食物一起服用均可。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是第二期或第三期的心臟傳導阻斷、心臟休克及持續低血壓或嚴重心跳徐緩、氣喘或其他肺臟疾病等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是非固醇消炎止痛藥(NSAIDs)、digoxin、verapamil、第一型抗心律不整用藥、三環抗憂鬱劑、cimetidine。
3. 因為這個藥會讓心跳變慢，糖尿病病友服用後可能使低血糖副作用發生時的心跳過速不明顯，請病友注意。
4. **本藥用來保護心臟時需長期定時服用**，若已長期服用未經醫師許可**請勿任意突然停藥**，可能會導致病情惡化。
5. 常見副作用為四肢冰冷、疲倦無力、頭暈，偶爾可能會引起皮膚紅疹、腸胃不適，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：尿量變少、心跳不規則且變慢。**
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。