



藥物成分

劑型

編號

Topiramate

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

妥泰分散型膜衣錠 25 毫克/膠囊(Topamax)

克癩膜衣錠 100 毫克/錠(Epilramate)

## ☞ 藥品作用

本藥主要用為局部癲癇、預防偏頭痛及及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療。

## ☞ 服用方式

1. 成人通常每晚 2 次，給藥 25-50 mg 開始，常用劑量為每日 200-400mg，分 2 次服用。二歲以上兒童請依醫師給予劑量服用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病特別是肝腎功能不良，青光眼，或服用其他癲癇藥品者。
2. 如果有接受血液透析者，透析期間建議補服相當於每日劑量一半之補充劑量，補充劑量應於透析期間分次投予，若有疑慮請諮詢您的醫師/藥師。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是口服避孕藥、metformin、pioglitazone、glyburide 等。
4. 服用 topiramate 時攝取充足的水份，以降低發生腎結石的危險性。
5. 治療期間若有情緒異常及抑鬱時，請告知醫師。
6. 常見副作用為體重減輕、感覺異常、嗜睡、注意力不集中、疲倦、口水增加、暈眩、步履不穩、憂鬱等現象。
7. 懷孕等級 D，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。