



## 藥物成分

**Bromhexine**

## 劑型

**口服液**

## 編號

### 药品商品名及含量

氣舒痰液 2 毫克/毫升 50 毫升/瓶 (Bisolvon Solution)

### 药品作用

減少痰液粘稠度，增加痰液清除以達到祛痰及緩解咳嗽。

### 服用方式

1. 口服：每日2-3次，每次依醫生開立劑量使用。

吸入：需使用霧化器，每日2次，依醫生開立劑量使用。

2. 口服使用：若服用水劑大於5毫升，可使用小量杯給藥；若小於5毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。

3. 吸入使用：使用前建議將溶液溫熱至體溫，並使用霧化裝置，須以1:1生理食鹽水稀釋，為避免混和溶液產生沈澱，與生理食鹽水混和完後請立即使用。

4. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

### 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是對製劑其他賦形劑過敏。

2. 正以 Bromhexine 治療之病人，痰液排除可能會增加。

3. 副作用非常少見，可能有痰量增加、咳嗽可能稍微加劇、腹瀉、噁心、嘔吐及其他輕微胃腸副作用，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：蕁麻疹及較嚴重的過敏性皮膚反應(皮膚紅疹或嘴破，且合併類流感的症狀，像是發燒、顫抖、肌痛或噁心嘔吐等)、血管性水腫等現象。

5. 懷孕等級 A，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。