

藥物成分

劑型

編號

Digoxin

口服液

☞ 藥品商品名及含量

地高新醣劑 0.05 毫克/毫升 60 毫升 (Cardiacin Elixir)

☞ 藥品作用

本藥是一種強心劑，主要用於治療心臟衰竭。

☞ 服用方式

1. 直接或和以開水吞服即可，每天 3-4 次服用，劑量依照醫師指示使用。包裝附有滴管使用。
2. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確
3. 不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝腎疾病、甲狀腺問題或任何其他心臟問題。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、鈣片、制酸劑、甲狀腺藥、心臟用藥等，使用前請先諮詢醫師或藥師。
3. 請在手術前(包含牙科手術)，讓醫師知道您正在使用此藥。
4. 常見副作用為頭暈、頭痛、疲倦，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：噁心、嘔吐、呼吸困難、心搏不規則、手腳水腫、視力模糊或看到物件外圍出現黃色光暈。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。