

藥物成分

劑型

編號

Lactulose

口服液

☞ 藥品商品名及含量

亞培杜化液 666 毫克/毫升 300 毫升/瓶 (Duphalac oral sol'n)

樂多糖漿 666 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Lactul syrup)

☞ 藥品作用

本藥可刺激結腸蠕動與調控血中氨濃度，可以緩解便秘、治療或預防門系肝腦病變、肝昏迷病症。

☞ 服用方式

1. 成人：治療便秘通常每日使用 15-30 毫升；治療門系肝腦病變每日 3-4 次，每次使用 30-45 毫升。
2. 小兒須依體重、年齡及病況由醫師判斷劑量。
3. 可搭配白開水、果汁或牛奶混合後使用。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是**糖尿病與半乳糖血症**患者。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是制酸劑(胃藥)、抗生素。
3. 若需做**大腸直腸鏡檢**請提前告知醫療人員有使用本藥。
4. 老人、肝功能不良患者、使用超過 6 個月以上以及嬰幼兒須注意脫水或電解質異常情形。
5. 溶液開封請置於室溫陰涼處，可保存 1 個月，若溶液呈現極深色、變質感或混濁時請勿使用。
6. 常見副作用包含**腹脹、腹痛、噁心、嘔吐**虛弱、無食慾等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. **如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹、呼吸困難、嚴重腹瀉**
8. 懷孕等級 B 級，女性計畫懷孕或已懷孕以及哺乳請事先告知或諮詢您的醫師。