



藥物成分	劑型	編號
Megestrol Acetate	口服液	

☞ 藥品商品名及含量

麥格斯口服懸液劑 40 毫克/毫升 120 毫升/瓶
(Megest Oral Suspension)

☞ 藥品作用

改善癌症及AIDS患者產生的惡病體質，可增加患者的食慾，預防體重減輕。

☞ 服用方式

1. 通常服用 10-20 毫升/天，分成 1-2 次服用。
2. 使用前應將容器振搖均勻。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是已知或懷疑懷孕。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗心律不整藥 **dofetilide**，兩者併用可能會增加心臟毒性(心律不整、心跳奏停)的風險。
3. 常見副作用為陰道出血、消化不良、腹瀉、陽痿、皮疹、脹氣、體重上升、四肢水腫、血糖上升、頭痛、噁心等，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：視覺出現變異(模糊或複試)、眼白/皮膚變黃、噁心嘔吐不止、不正常的出血/瘀青，下肢嚴重水腫、突發性的側邊頭痛或單側麻木、胸痛、呼吸困難、臉部或喉部腫脹。
5. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到母乳裡，不建議服藥期間哺乳。