



藥物成分	劑型	編號
Azithromycin	口服液	

☞ 藥品商品名及含量

日舒懸液用粉 200 毫克/5 毫升 15 毫升
(Zithromax Powder for Oral Suspension)

☞ 藥品作用

本藥為巨環類抗生素，用於治療細菌引起之感染症。

☞ 服用方式

1. 通常每日一次於固定時間使用，用量請遵照醫師指示服用。
2. 請依照以下步驟配製日舒懸浮液。

1. 本藥使用前請先**搖鬆粉末**，接著**按住瓶蓋並依箭頭方向旋轉開啟瓶蓋**。

(瓶蓋設計為兒童安全包裝)

2. **利用包裝中所附的針筒**

(針筒上有蓋子需先拿開，整支針筒可抽 10 毫升的水)

將 9 毫升冷開水加入藥瓶中，然後充分搖勻。

加水溶解後每瓶共 15 毫升。

※配置完後請放**室溫陰涼處**保存，**勿冷藏**



3. 在每次使用懸浮液之前，務必**再充分搖動藥瓶**，接著使用**所附針筒或量杯或包裝內之量匙**測量使用。



→ 10 毫升

→ 5 毫升



3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。



注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對巨環類抗生素(如 erythromycin)或 ketolides 類抗生素(如 telithromycin) 過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是麥角鹼衍生物、digoxin、cyclosporine、coumarin 類抗凝血劑、Phenytoin 等。
3. 服用本藥期間，請不要與含鋁或鎂的制酸劑、鐵劑或鈣片同時併服，服用時間應錯開 2 小時以上，以免影響藥效。
4. 配製後至多可存放室溫下 **5 日** (不須冷藏)，剩餘藥品請攜至藥局回收，勿沖進洗手台或馬桶。
5. 本藥品含有蔗糖，若病患有葡萄糖半乳糖吸收不良，或者蔗糖酶-異麥芽糖酶缺乏症或有罕見之先天果糖不耐症，需先諮詢醫師/藥師。
6. **即使症狀改善，請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。**
7. 常見副作用為胃腸不適如腹瀉、腹痛、噁心和嘔吐，但一般都不嚴重，可與食物一起服用減不適感，若症狀惡化且無法忍受請回診，不建議擅自服用止瀉劑。
8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮疹、呼吸困難、胸痛、心跳不規則、尿液變黑、不正常出血、皮膚或眼睛顏色變黃。**
9. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。