



| 藥物成分 | 劑型 | 編號 |
|----------------|-----|----|
| Clarithromycin | 口服液 | |

☞ 藥品商品名及含量

開羅理黴素懸液劑 125 毫克/5 毫升 70 毫升
(Klaricid Paediatric suspension)

☞ 藥品作用

本藥為抗生素，用於治療微生物引起的感染問題。

☞ 服用方式

1. 使用前請先將粉劑配置成口服用懸浮液。請先將 **37 毫升之冷開水** 加入顆粒劑瓶中（可使用藥局所附 10 毫升之小量杯測量），振搖均勻調配成懸液劑。
2. 配置的懸浮液可在 **室溫下(25°C)可保存 14 天，請勿冷藏。**
3. 每次使用前請先搖勻，每日 2 次，每次用量請依藥袋指示。
4. 此懸液劑可空腹或與食物併服，且可與牛奶一起服用。
5. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對巨環類抗生素(如 erythromycin)過敏。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是麥角鹼衍生物、astemizole、cisapride、pimozide、terfenadine、midazolam、statins 類降血脂藥(如 lovastatin、simvastatin)、colchicine 等。
3. **請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。**
4. 本藥含有蔗糖，患有罕見的遺傳性果糖不耐受疾病，葡萄糖半乳糖吸收不良或蔗糖酶-異麥芽糖不全病人不建議使用。
5. 常見副作用為腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐和味覺錯亂，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：紅疹或血管水腫等過敏反應。**
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。