



藥物成分	劑型	編號
Ibuprofen	口服液	

## ☞ 藥品商品名及含量

舒抑痛口浮懸液 20 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Idofen Susp.)

## ☞ 藥品作用

消炎、鎮痛、解熱。

## ☞ 服用方式

1. 6 個月-12 歲孩童：通常每日 3-4 次，每次間隔 6-8 小時。兒童使用量會依體重計算；成人：每日 4 次，每次 10-20 毫升。
2. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
3. 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。
4. **使用前請務必搖晃均勻。**
5. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是消化性潰瘍或胃腸出血、肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 cyclosporine、利尿劑、methotrexate、銀杏。
3. 除非經醫生指示，治療期間避免服用額外的非類固醇性消炎止痛藥(NSAIDs)或阿斯匹靈(asprin)。
4. **患消化性潰瘍或胃腸道出血者，服藥時請勿抽菸飲酒。**
5. 常見副作用為皮疹、液體滯留(水腫)、腹部不適、嘔吐、頭痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：不明出血(吐血、血便/黑便、血尿)、嚴重腹痛/胃部灼熱感。**
7. 此藥對於懷孕婦女之安全性卻未確定，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。可能會分泌到母乳裡，無法排除對嬰兒風險，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。