

藥物成分

劑型

編號

Levetiracetam

口服液

☞ 藥品商品名及含量

優閒內服液劑 100 毫克/毫升 300 毫升/瓶 (Keppra Oral Solution)

☞ 藥品作用

治療成人及四歲以上孩童之癲癇局部發作（併有或不併有次發性全身發作）的輔助治療。

☞ 服用方式

1. 初始劑量為每天兩次，每次 10 mg/kg。視病人的臨床反應及耐受性，劑量可增加至最高每次 30 mg/kg，本藥須由醫師處方使用。
2. 本藥可與水併服，飯前或飯後服用均可。盒內附有具刻度之量器。建議每日劑量平均分早、晚兩次使用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

使用方法	藥品外觀
用附的針管吸取適當劑量	



∞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對主成分 levetiracetam 或對其他 pyrrolidone 衍生物或本藥其他賦形劑敏感者，肝腎功能不良。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是：葉酸拮抗劑 methotrexate。
3. 本產品含有麥芽糖醇液體，因此有罕見之果糖不耐性遺傳問題的病患不可使用。
4. 本產品含有甘油，可能會引發頭痛、胃部不適與腹瀉。
5. 有效期限未開封見標示，開封後為首次開封後兩個月。
6. 本藥可能引起嗜睡、暈眩及無力感，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械及從事具潛在危險之活動。
7. 常見副作用為鼻咽炎、睏倦、頭痛、疲勞與暈眩，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
- 8. 如果出現憂鬱症及/或自殺意念或行為、嗜睡、精神激昂、具攻擊性、意識障礙、呼吸抑制、昏迷，請立刻就醫。**
9. 懷孕等級 C，除有明確必要外，不建議懷孕婦女與具有生育能力但未避孕的婦女使用本藥。本藥會分泌到母乳裡，故不建議授乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。