



藥物成分

劑型

編號

Acetaminophen

口服液

药品商品名及含量

安佳熱口服液 24 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Anti-Phen Syrup.)

药品作用

退燒、止痛。

服用方式

1. 發燒或需要時服用，若症狀持續，則每 4-6 小時可重複使用 24 小時之內不可超過 5 次。
 - (1) 6 歲以上未滿 12 歲:每次 10 -15 毫升。
 - (2) 3 歲以上未滿 6 歲:每次 5- 7.5 毫升。
 - (3) 3 歲以下之嬰幼兒:未經醫師指示不宜自行使用。
2. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
3. 若使用小量杯測量藥液，請確保測量時眼睛與刻度平視。
4. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。
若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，
在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。
- 5.

注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是肝臟疾病。
2. 此藥品含阿斯巴甜(aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者不宜使用。
3. 常見副作用為皮膚紅疹、噁心、嘔吐、便祕、頭痛等症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸急促、喘鳴，臉部、唇、舌頭、喉嚨或其他身體部位腫脹，起疹，脫皮，蕁麻疹，皮膚癢。
5. 目前未有明確證據在懷孕婦女中使用，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。