



藥物成分	劑型	編號
Theophylline	口服液	

☞ 藥品商品名及含量

適優喘液 5.34 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Centertheo liq.)

舒喘內服液 5.34 毫克/毫升 60 毫升/瓶 (Ventol liq.)

☞ 藥品作用

支氣管擴張劑，可緩解呼吸困難，使呼吸道暢通。並非用於氣喘或其他呼吸道症狀之急性發作。

☞ 服用方式

1. 通常每日 2~4 次，每次毫升數依病情及小兒體重有所不同。
2. 若所需服用水劑大於 5 毫升，可使用小量杯給藥；若小於 5 毫升，使用針筒、滴管或口服餵藥器較為準確。
3. **請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數 (尤其是小孩)**。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是甲狀腺疾病、冠狀動脈疾病或胃潰瘍。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥品，包含保健食品，藥師會幫您評估是否有藥品交互作用。
3. 避免飲用大量葡萄柚汁，**並請注意不要攝取過多含咖啡因的飲料或食物**(如：咖啡、茶)，會加重此藥心悸之副作用。
4. **服藥期間請勿吸菸**，吸菸會降低這個藥的藥效。
5. 適優喘液含阿斯巴甜 (Aspartame) 賦形劑，苯酮尿症患者 (Phenylketonurics) 不宜使用。
6. 常見副作用為心跳加快、噁心、頭痛、失眠、頭/手指輕微震顫、煩躁，但一般不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. **如果有下列症狀，請立刻就醫：嘔吐 (特別是嘔吐物為深褐色)、心律不整、心悸、呼吸急促且喘、耳鳴、癲癇。**
8. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；本藥哺乳婦女可使用。