



藥物成分

劑型

編號

Amoxicillin/
Clavulanate

口服液

☞ 藥品商品名及含量

安滅菌糖漿用粉劑 400 毫克+57 毫克/5 毫升 35 毫升
(Augmentin Syrup)

☞ 藥品作用

本藥為盤尼西林類抗生素，用於治療葡萄球菌等特定細菌引起的感染問題。

☞ 服用方式

配置懸浮液：

配製前請先搖鬆粉末。
再加冷水至刻線一半左右高度，充分搖晃混合。
再繼續加入冷水至**箭頭刻線處**，完成後需整瓶放置冰箱冷藏(2-8°C)。
每次使用前須先搖混均勻再倒出單次劑量。



最後泡製到刻線

第一次加水請加到一半左右，再進行搖晃混合

1. 通常每日 2 次，每次間隔 12 小時，無需考慮飯前飯後皆可服用，兒童使用量會依照體重與感染問題而不同。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 配置後請冷藏保存最多 7 日，剩餘藥品請攜回藥局回收。
2. 即使症狀消失也請按醫囑確實完成療程頻率及天數，避免產生抗藥性。
3. 常見副作用為腹瀉、噁心或嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮疹、蕁麻疹、臉或手部腫脹、呼吸/吞嚥困難、血便、發燒。
5. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量稀少，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。