



藥物成分	劑型	編號
Budesonide	噴霧吸入劑	

☞ **藥品商品名及含量**

帝舒滿定量噴霧劑 200 微克/每定量 200 定量/瓶
(Duasma HFA 200mcg)

☞ **藥品作用**


成人及大於6歲以上的兒童之支氣管氣喘。

☞ **使用方式**


1. 成人及大於 12 歲之孩童：通常每日 2 次，每次 1-4 個劑量。
6-12 歲兒童：通常每日 2 次，每次 1-2 個劑量。
2. 隨瓶附贈吸入輔助器，**建議需長期使用的話請用輔助器**，可以降低藥物在全身性的吸收，且改善藥物在肺部的沉積量
3. **全新的**定量噴霧器在使用前，需搖動後對空噴壓 2 下。
4. 之後每次吸入的使用步驟如下：

方法1. 未使用輔助器：


1. 先移去口含器的護蓋。



2. 每次使用前必須充分搖動本藥。




3. 先緩慢對旁邊吐氣，排除肺內空氣。



4. 含住噴嘴，按壓一下後**同時深深慢慢地吸氣**。

5. 吸完氣候閉氣數秒(5~10秒鐘)。


6. 移除噴嘴後即可正常呼吸。




(若需要吸第2次劑量，請間隔30~60秒後再重複一次步驟3~7，使用後蓋回保護蓋，不可連續按壓兩次)

方法2. 使用吸入輔助器：(推薦用法)


1. 先移去口含器的護蓋。




2. 將吸入輔助器較粗一邊與噴霧液的含口器接合。



3. 上下搖動噴霧液罐，同時確定連接處是否緊密。




4. 先緩慢深深吐氣，排除肺內空氣



5. 拿穩定量噴霧器，將吸入輔助器含於口中，按壓藥罐。

6. **同時以正常速度深深慢地吸入**，吸入後閉氣5~10秒。

7. 移除吸入輔助器，慢慢呼吸。



(若需要吸第2次劑量，請間隔30~60秒後再重複一次步驟3~7，使用後蓋回保護蓋，不可連續按壓兩次)

⌘ 注意事項

1. 請依照醫師療程正確使用，不可自行調整劑量或增加次數。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是中度到重度的支氣管擴張症。
3. **使用完後請以清水漱口**，減少念珠菌感染造成鵝口瘡。
4. 常見副作用為喉部輕微刺激，咳嗽及可逆性的聲音沙啞，但一般都不嚴重，這些副作用可能因使用輔助器而改善，若症狀惡化且無法忍受請回診。

⌘ 清潔方式

建議每週清潔一次，以乾面紙或布清理乾淨，吸入器本體不可用水清洗。

⌘ 如何得知剩餘藥量

本藥無剩餘量計數器，請諮詢藥師協助黏貼標籤紀錄使用日期或以畫記號方式記錄。