



|                    |              |           |
|--------------------|--------------|-----------|
| <b>藥物成分</b>        | <b>劑型</b>    | <b>編號</b> |
| <b>Ciclesonide</b> | <b>噴霧吸入劑</b> |           |

☞ **藥品商品名及含量**

保衛康治喘樂吸入劑 160 微公克/每定量 60 定量/瓶  
(Alvesco 160 Inhaler)



☞ **藥品作用**

成人、青少年及 4 歲以上兒童之持續性氣喘  
本品只可用於氣喘的預防，並不能用於減緩急性氣喘症狀。

☞ **服用方式**

如果要使用新的吸入劑或吸入劑已一個星期以上未使用的話，一開始須先對著空氣噴 3 次後才可使用。  
之後每次劑量皆按照下列步驟使用：

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | <p>步驟一、將吸入器噴嘴之護蓋取下。</p>               |
|  | <p>步驟二、檢查吸入器是否清潔與乾淨。</p>              |
|  | <p>步驟三、將食指放在吸入器頂部，拇指放在底部保持瓶底向上位置。</p> |
|  | <p>步驟四、用輕鬆舒適方式盡可能地吐氣。</p>             |
|  | <p>步驟五、將吸入器噴嘴放入口，並以雙唇緊密包住噴嘴。</p>      |

|   |   |
|---|---|
|  | <p>步驟六、開始用嘴巴吸氣時，<b>同時按壓一下吸入器，持續緩慢的深深吸氣。</b></p>     |
|  | <p>步驟七、然後從嘴巴移開吸入器，並屏住呼吸約 10 秒時間。</p>                |
|  | <p>步驟八、最後慢慢地呼氣，如需要使用第 2 下，請休息 30-60 秒後，重複步驟三-七。</p> |

## ⊗ 注意事項

1. 對於 Alvesco 所含任一成分過敏者禁忌使用。
2. 通常每日 1~2 次，每次 1~2 下，當 Alvesco 為一天投與 1 次時，比較建議在**晚上投與**，但早上投與也是有效的，請依照醫師的指示，固定於早上或晚上投與。
3. 常見不良反應包括逆理性氣管痙攣(發生率 10%)，重症患者可能需考慮停用 Alvesco，其它較不常見之不良反應包括**口腔黴菌感染、噁心、嘔吐、味道不佳、喉嚨乾、咳嗽、頭痛**等，請於回診時由醫師檢查醫治。
4. 此劑型為液狀噴霧劑，使用前無須搖晃；**使用完後請漱口，減少鵝口瘡發生的機率。**
5. 目前沒有懷孕或哺乳方面的安全性資料，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。
6. 容器內含增壓液體，請於室溫下儲存。

## ⊗ 清潔方式

建議每周清潔一次。請用乾的面紙或布清理乾淨，**吸入器本體不能用水清洗或放於水中。**

## ⊗ 如何觀測剩餘藥量

本藥無劑量視窗，請諮詢藥師於藥品開封時於瓶身寫上開封日期以便計算剩餘藥量。請時常計算檢查剩餘藥量，於藥物快用完前回診拿藥。