



藥物成分

劑型

編號

Sulconazole

外用液

藥品商品名及含量

優足達液劑 1% (10 毫克/毫升) 10 毫升/瓶
(Exelderm Solution)

藥品作用

為抗黴菌劑，用於皮膚黴菌病之治療：足癬(香港腳)、股癬、體癬、皮膚念珠菌症、花斑癬(汗斑)。

使用方式

1. 通常每日 2-3 次，適量塗抹於患部。
2. 本藥需按醫囑完成所有療程，避免感染症復發。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記，請立即補擦，但若已接近下一次時間，在下次擦藥時間使用即可。

注意事項

1. 本品不得用於眼部、嚴重糜爛或有外傷的部位。因本品有刺激性，在龜裂與糜爛部位應小心使用。
2. 若用藥 4-6 週後病症仍無改善，請回診告知醫師。
3. 常見副作用為皮膚搔癢感、輕微刺激感、暫時性灼熱感、接觸性皮膚炎、發炎等症狀，症狀一般不嚴重，若症狀惡化或出現皮膚腫脹感、嚴重發紅/刺痛、浸軟、丘疹、異常乾燥等，請回診就醫。
4. 此藥用於孕婦及哺乳婦女的安全性仍未確立，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。