

藥物成分	劑型	編號
Oxymetazoline	鼻噴劑	

☞ 藥品商品名及含量

醫鼻易噴鼻液 0.5 毫克/毫升 10 毫升/瓶
(Sindecon Nasal Spray)


☞ 藥品作用

本藥是種局部血管收縮劑，主要用於緩解鼻黏膜充血、腫脹引起的鼻塞症狀。


☞ 使用方式

※每瓶第一次使用前，對空噴壓藥劑數次，直到有藥劑噴出。接下來使用不需再排空空氣，如果到下次使用前的時間超過 24 小時，使用前只需對空噴壓一次即可。(如圖一)

1. 輕擤鼻子，將鼻孔清理乾淨。
2. 打開瓶蓋及拉開扣環(在按壓處的側邊)。
3. 使用前要將藥品搖勻。
4. 以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座。
5. 將噴頭插入一側鼻孔中，以另一隻手指輕壓另一側鼻孔，依上述方法快速壓下噴頭，同時緩緩深吸氣，將噴鼻液吸入鼻腔內，吸完後自口部慢慢呼氣。(如圖二)
6. 在另一邊鼻孔重複相同步驟。
7. 使用完畢，將噴頭以面紙輕拭乾淨，蓋回保護蓋。



圖一



圖二



⊗ 注意事項

1. 請依照藥袋指示使用，如果藥袋指示每次 1 下，指的是兩邊鼻孔都各噴 1 下。
2. 請依照醫師指示使用，不建議在未經指示情況下自行增加使用次數。如果忘記噴藥的話，應該在想起時，立即使用。但是，如果距離下次用藥的時間太近，就應該捨棄此次的藥物，恢復到下次正常用藥的時間，不可一次使用雙倍的劑量。
3. 本藥為症狀改善藥，一般都**短期**使用，若使用超過三日症狀仍無改善，請回診告訴醫師。
4. 本藥無 6 歲以下小兒使用的安全性資料，除非經醫師指示否則不得自行使用。
5. 對本藥品之成分有過敏者，禁止使用。

副作用如下：

- (1) 常見：頭痛，失眠，神經緊張，反彈鼻塞，**鼻粘膜乾燥，鼻刺痛/輕微灼痛**，打噴嚏。但這些副作用一般都不嚴重，如果變嚴重或持續存在，請告知您的醫師。
 - (2) 嚴重：心律失常，高血壓，快速性心律失常。非常罕見，如有發生請立即停藥並回診
6. 本藥品可儲存於室溫陰涼處，避免直接日照或放入冰箱。
 7. 目前無良好的資料證明孕期的安全性，不能排除胎兒風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師
 8. 本藥品不應使用於授乳期，因尚無足夠證據顯示授乳期使用是安全的，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。