



藥物成分	劑型	編號
Lidocaine/ Neomycin/ Polymyxin	耳滴劑	

☞ 藥品商品名及含量

耳多贊邦點耳液劑 40 毫克+3.75 毫克+10000 單位/毫升  
8 毫升/瓶 (Otozambon Ear Drop)

☞ 藥品作用

本品用於治療因細菌感染引起之耳部及耳部外聽道發炎。

☞ 使用方式

耳多贊邦點耳液劑使用方式：

1. 請先拆除瓶身壓條。
2. 依箭頭所示方向打開瓶蓋。
3. 雙指輕壓**深紅色橡膠處**，即可擠出藥劑。



耳滴劑使用說明：

1. 用肥皂及清水清洗雙手。
2. 用濕的面巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。
3. 將藥劑輕輕滾動或輕握數秒，使藥液溫度接近體溫，減少對耳朵的刺激。
4. 耳滴劑使用前須充分振搖。




5. 側躺或頭傾斜使受感染耳側朝上。
6. 成人可將耳葉拉向後上方，小孩則拉向後下方，使耳道變直。
7. 滴入適量藥劑，保持耳部朝上使藥液流入。





## 使用方式~續

8. 藥劑滴入後，輕拉耳朵或輕壓耳珠，使氣泡跑出。
9. 保持耳部朝上，讓藥劑停留約 5 至 10 分鐘後，再讓它自然流出，以紙巾擦拭留出藥液。
10. 用肥皂及清水清潔雙手。



## 注意事項

1. 通常每日使用 2~4 次，每次 4~5 滴。劑量依疾病嚴重度及個別反應不同，**必須遵照醫師指示常規用藥，不可自行更改劑量或自行停藥。**
2. 使用時應避免接觸到滴管頭而造成污染，以保持藥液的清潔。
3. 儲存方法：**室溫保存，不可置於冰箱內冷藏，避免給藥後造成暈眩不適**；開瓶後，保存期限為六個月，若外觀出現異常變化請勿使用。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
5. 常見副作用為耳朵疼痛、頭痛、暈眩、嘴內有苦味，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**皮膚發疹、過敏反應、聽力異常等。**