



藥物成分

Mesalazine

劑型

灌腸液

編號

☞ 藥品商品名及含量

阿腸克浣腸液 2 克/100 毫升/瓶 (Colasa enema)

☞ 藥品作用

Mesalazine 是抑制發炎的藥物，用於潰瘍性結腸炎、輕度到中度直腸炎及直腸乙狀結腸炎的治療。

☞ 使用方式

1. 通常於睡前使用 1~2 瓶，請依照醫師囑咐使用。
2. 使用前先把浣腸劑置於溫水中約 10 分鐘使藥品接近體溫。
3. 插入浣腸劑前，請先將藥品振搖均勻。
4. 打開瓶蓋後，將所附插管插在瓶口，使用少許凡士林塗在浣腸劑的插管上。
5. 請採用側臥姿勢投與藥品(如右圖)，左側側臥，左腳伸直，右腳彎曲。
6. 將藥液**慢慢地(至少一分鐘)**全部擠進肛門內。
7. 之後維持相同姿勢 5-10 分鐘，然後以平常姿勢睡覺，盡量至第二天早上再排便。



☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病正在服用其他治療藥物，特別是水楊酸(阿斯匹靈)、抗凝血劑(warfarin)、免疫抑制劑(cyclosporine)、非固醇類止痛藥等。
2. 2 歲以下兒童及嚴重肝腎功能不良者不可使用本品。
3. 存放時盡量瓶口朝上直立，可避免結塊形成。
4. 開蓋時若有棕色結塊掉落，可取出搖勻後再使用。
5. 常見副作用為輕微腹痛、脹氣、打嗝、頭痛、腹瀉、噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。