

藥物成分

劑型

編號

Benzoyl Peroxide

外用藥膏

☞ 藥品商品名及含量

雅若凝膠 50 毫克/克 10 克/支 (Aczo Gel)

☞ 藥品作用

青春痘治療劑

☞ 使用方式

1. 通常每日 1~2 次，塗於患部。
2. 剛開始使用時可能會有症狀惡化之現象，但持續使用本品，通常 4~6 星期可見痤瘡的症狀獲得改善。
3. 限皮膚外用不可內服，不可接觸眼睛/口腔/鼻子內的黏膜。
4. 若要塗抹於眼睛四周，需先經醫師指示。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾對青春痘藥膏過敏。
2. 使用前後應徹底洗淨雙手。
3. 使用期間須避免過度日曬，請適當防曬。
4. 毛髮、衣物不可接觸本品，以免被漂白脫色。
5. 使用期間避免是用含藥化妝品或其他刺激性的潔膚品。
6. 常見副作用為過敏性皮膚炎(小發紅)、皮膚乾燥、脫皮、刺痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 若使用過量而造成皮膚過度乾燥或刺激皮膚，請暫停用藥。
8. 如果有下列症狀，請立刻停藥就醫：極度刺激/灼熱感、紅腫、脫皮現象、皮疹。
9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。