



藥物成分	劑型	編號
Fluticasone/ Salmeterol	噴霧吸入劑	

- ☞ 藥品商品名及含量 (120 劑量/瓶)  
使肺泰優氣吸入劑 250 微公克/劑量 (Seretide 250 Evohaler)  
使肺泰優氣吸入劑 50 微公克/劑量 (Seretide 50 Evohaler)

- ☞ 藥品作用  
治療氣喘(可逆性呼吸道阻塞疾病)及慢性阻塞性肺部疾病。

### ☞ 使用方式

1. 通常每日 2 次，每次 2 下。

※ 第一次使用時，請先對空氣試噴數下，直到計數視窗顯示【120】時才可使用。如果超過一星期或更久以上未使用時，請對空試噴一下確認有噴霧產生才可使用。

2. 使用吸入劑：

	<p>步驟一、移除吸口蓋，輕輕擠壓吸口蓋的兩側。</p> <p>步驟二、檢查吸入器內外，包含吸口是否有鬆動物。若有輔助器(延伸管)請接上。</p>
	<p>步驟三、將吸入器直立置於拇指與食指之間，拇指放在底部，亦即吸口的下方。</p> <p>步驟四、充分振搖吸入器並確定移除所有鬆動物及確保吸入器內容物已混合均勻。</p>
<p>步驟五、先朝旁邊盡量呼氣(吐出氣體)，然後將吸口置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬它。</p>	



步驟六、用食指在吸入器的上方往下壓**1**下，同時保持穩定慢慢且深的吸氣動作。



步驟七、吸完後握住呼吸並將吸入器移開口部，繼續握住呼吸，時間愈久愈好(最少**5-10**秒)，直到感到不舒服為止。

步驟八、以水漱洗口腔並吐出。

步驟九、使用後應立即將吸口蓋回。

- 如果需要吸入第2下，則將吸入器繼續保持直立，大約等30~60秒後再重複步驟3至步驟7。

## ☞ 注意事項

1. 對於本藥所含任一成分過敏者禁止使用。
2. 使用完後請漱口，減少口腔與喉嚨念珠菌病發生的機率。
3. 目前沒有懷孕或哺乳方面的安全性資料，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。
4. 常見副作用為可能有咳嗽、聲音嘶啞、心悸、頭痛等現象，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。

## ☞ 清潔方式

1. 吸入劑必須至少一個禮拜清潔一次。  
請移開吸口蓋。以乾布、面紙，或棉布將吸嘴與塑膠外殼之內外擦拭乾淨。
2. 請勿將本藥放入水中，也不可將金屬罐自塑膠外殼中取出。

## ☞ 如何觀測剩餘藥量

本藥後方有計數視窗，當顯示【020】時，請回診領取新的藥劑。當計數視窗顯示【000】時，就一定要換新，此後任何按壓就算有噴出氣霧，內含藥量都可能不完整。