



藥物成分

劑型

編號

Desmopressin**鼻噴劑****◎ 藥品商品名及含量**

迷你寧鼻腔噴霧劑 10 微克/0.1 毫升/噴 2.5 毫升/瓶
(Minirin Nasal Spray)

◎ 藥品作用

- 1.此藥結構與體內賀爾蒙相似，明顯地增加抗利尿作用，而幾乎不對平滑肌作用，故可避免不需要的加壓素副作用。
- 2.治療中樞性尿崩症、夜間遺尿與腎功能試驗。

◎ 服用方式



本藥藥袋若指示每次 1 下，指得是單一鼻孔噴 1 次。

第一次使用(或數日未使用)，請先對空噴壓 4 次，或直到有藥品噴出來為止。


鼻噴劑用法：

1. 使用噴鼻劑前先清乾淨雙手及擤乾淨鼻孔。

2. 取下噴霧劑的瓶蓋，並以手握住藥瓶，如圖 2 所示。



3. 頭稍向後仰 15~30 度，將噴霧劑的噴管插入其中一個鼻孔。



4. 先屏住呼吸，按壓噴鼻器(噴藥時必須維持閉氣)，並保持頭部後仰的姿勢。

5. 如果需要使用兩個以上劑量時(噴兩次以上)，請兩個鼻孔輪流使用。

6. 使用完，請將瓶蓋蓋好，並保持藥瓶正放，勿倒置。



8 注意事項

1. 當忘記服用一個劑量時：儘可能在您想起時立刻補噴一個劑量，但若幾乎到了使用下一個劑量的時間，那就略去錯過的劑量並繼續按照原本的用藥方式。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量
2. 請告訴醫師或藥師，您是否有藥物過敏或其他的疾病，如心血管疾病、腎臟疾病、習慣性或精神性劇渴症。
3. 請告訴醫師或藥師您在服用的藥物，特別是利尿劑、三環抗憂鬱劑(TCA)、選擇性的血清素再吸收抑制劑(SSRI)、chlorpromazine、carbamazepine 等，因為有許多藥會影響本藥之藥效。
4. 用藥期間，請控制水分的攝取量，以避免過多水分滯留在體內，造成副作用的產生。治療夜尿症時，使用藥品前 1 小時到使用藥品後 8 小時內，建議水分攝取不要超過 500 毫升。
5. 常見副作用為頭痛、潮紅感、胃痛、嘔吐、鼻塞、鼻炎、流鼻血等症狀，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：水腫、體重快速增加、血鈉濃度下降(噁心/嘔吐、頭暈、嚴重嗜睡)、昏迷、意識混亂、痙攣等。
7. 雖然多數研究都不影響胎兒但因資料過少仍不能排除風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。