



藥物成分	劑型	編號
Glycopyrronium 乾粉吸入劑		

☞ 藥品商品名及含量

吸補力吸入膠囊 50 微克/膠囊 30 粒/盒 (Seebri Breezhaler)

☞ 藥品作用

可阻斷乙醯膽鹼作用於呼吸道平滑肌造成的支氣管收縮，而使支氣管擴張。用於慢性阻塞性肺疾病之維持治療。

☞ 使用方式(本膠囊不可以直接吞服! 請務必正確使用吸入器)

		<p>1. 拔開帽蓋 2. 打開吸入器： 以傾斜掰開口含器的方式，將吸入器打開。</p>
		<p>3、4. 取出膠囊： 要使用前才撕開背面的保護膜，取出膠囊。 以乾燥的手將膠囊由鋁箔片中取出。</p>
		<p>5、6. 裝入膠囊後，蓋上吸入器 不可直接將膠囊放進口含器中。 不可直接吞服膠囊。</p>
		<p>7、8. 刺破膠囊： 直立握住吸入器，口含器朝上。 同時緊壓兩邊的按鈕來刺破膠囊，只可按一次。</p>
		<p>9. 吐氣： 在口含器放入嘴巴之前，要將氣完全吐出。 不可對著口含器吐氣。</p>
		<p>10. 吸藥： 握住吸入器，緊閉雙唇含住口含器。 快速但穩定吸氣，儘可能深深吸氣。 不可壓到兩側的按鈕。</p>



11. 閉氣：

吸藥以後，吸入器由口中移出，閉氣至少 5 至 10 秒，或在無不適的情況下，能閉氣多久就閉氣多久，然後呼氣。

打開吸入器檢視膠囊中是否仍有粉末殘留。

如果膠囊中仍有粉末：

關上吸入器，重覆步驟 9 至 11。

- 如果您吸藥後有咳嗽，請勿擔心，只要檢查膠囊的粉末有吸完，就會吸進足夠的劑量。
- **吸藥時，膠囊會在膠囊室中旋轉，您會聽見呼呼的聲音，**如果沒有聽見呼呼的聲音，可能是膠囊卡在膠囊室中，若發生這種情況時，可採取以下兩種做法：
 1. 打開吸入器並小心輕拍底座來使膠囊鬆動。不可以壓到兩邊的按鈕。
 2. 重覆步驟 9 和 10 再吸一次藥。

∞ 注意事項

1. 建議每日相同時間使用吸補力吸入器每天吸一次，一次 1 粒膠囊。不建議一天使用超過 1 個劑量。
2. **本藥含有乳糖成份，所以吸入時會覺得甜甜是正常的。**
3. 常見副作用：口乾、腸胃炎、失眠。
4. 做為慢性阻塞性肺疾病之維持治療，不可用於急性呼吸困難發作時緩解用。
5. 請告訴醫師你是否使用其他藥物，特別是其他抗膽鹼藥品 (aclidinium、ipratropium、tiotropium、umeclidinium)。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕/已懷孕請告知您的醫師；本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。
7. 用藥如有任何疑問，應諮詢專業醫療人員；用藥後如出現不適症狀，應立即告知醫療人員或盡速就醫。

∞ 清潔方式

吸入器使用後，使用乾的衛生紙擦拭即可，請勿用水沖洗。使用 30 天後要丟棄。