




<b>藥物成分</b>	<b>劑型</b>	<b>編號</b>
<b>肛門栓劑</b>	<b>外用藥</b>	

**本院品項及主要作用**


商品名及含量	成分名	主要作用
非炎栓劑 12.5克/粒 (Voren supp.)	Diclofenac	消炎、止痛、退燒
無秘栓劑 10克/粒 (Bisacodyl supp.)	Bisacodyl	刺激腸蠕動，緩解便秘
宜痔平栓劑 2.5克及100克/粒 (Posuline supp.)	Cinchocaine/ Policresulen	緩解痔瘡、肛門裂傷或 肛門周圍炎的搔癢、疼 痛、發炎及不適
痔克妥栓劑 2.5克及100克/粒 (Faktu supp.)		
吐福栓劑 10克/粒 (Domper supp.)	Domperidone	緩解噁心嘔吐、增強腸 胃蠕動

**使用方式**

<p>1. 使用肛門栓劑前後需用肥皂及清水將雙手洗淨。</p>	<p>2. 打開或撕開栓劑的外包裝。</p>
---------------------------------	------------------------




3. 側躺於床，一腳屈膝向前，用手將臀部抬起，露出肛門位置。






- 將栓劑由尖端沿著肛門口緩緩推入  
推入深度  
成人約 1~2 指節(2.5 公分~4 公分)  
嬰幼兒可推入半指節到 1 指節深度  
(1.5 公分~2.5 公分)



- 塞完後臀肌用力夾住肛門至少 1 分鐘，避免栓劑被反射性排出(幼兒可用手幫忙輕夾臀部輔助)，之後保持躺姿 15 分鐘。



## ⊗ 注意事項

- 使用前請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或準備懷孕、正在懷孕/哺乳、直腸結構問題或其他腸胃道疾病。
- 平時應存放於陰涼防潮處(除非有藥袋有特殊指示)，若因炎熱變軟無法使用，可將原包裝的栓劑放在冷藏或冰水內 30 分鐘後，再去除包裝使用。
- 塞入前可用水性潤滑劑或冷水稍微潤濕栓劑前端再塞入。  
(不可使用凡士林作為潤滑劑，避免影響藥效)
- 使用後可能會有輕微搔癢或黏濁液體流出，是正常的不需太過於擔心，但若肛門附近出現持續的**刺激感/疼痛、腹痛或過敏反應(皮膚紅疹、搔癢、全身不適)**時，應停藥並儘速聯繫醫療人員。