



藥物成分

劑型

編號

Lactic acid/
Salicylic acid

外用液

☞ 藥品商品名及含量

治疣液 16.7%+16.7%/Flexible Collodion 15 毫升/瓶
(Duofilm Liquid)

☞ 藥品作用

治疣液含水楊酸及乳酸成分，其作用係以其角質溶解作用除去被疣濾過性病毒所感染之上皮細胞。

☞ 服用方式

1. 先將疣之部位浸泡於熱水中至少 5 分鐘，並用浮石或銼刀輕輕磨去多餘角質，然後用乾毛巾擦乾。
2. 每天 1 次，使用所附的刷子，將 2~4 滴治疣液，均勻塗刷於疣之患部。
3. 塗抹第 1 滴之後，需請先待患處完全乾後，再滴第 2 滴。
4. 不可使藥水觸及正常皮膚，等藥水乾涸後可用 OK 繃或透氣膠帶輕敷於患部，以增加藥水的穿透力。
5. 治療 2-4 周，逐漸有效果。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是糖尿病。糖尿病及血液循環障礙患者慎用，若部位有黑痣、胎記，亦先請教醫師否則不得使用。
2. 倘塗於疣周圍正常肌膚時會有刺激性，如暫停使用此種刺激感會消失，待無刺激感時再恢復使用，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
3. 本品僅限外用，請勿觸及眼睛、臉部、生殖器或黏膜部位，以及疣周圍之正常皮膚。倘若誤觸，請立刻用清水沖洗 15 分鐘。
4. 目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知您的醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師。