

藥物成分

Budesonide

劑型

鼻噴劑

編號

☞ 藥品商品名及含量

能舒鼻鼻腔定量噴液劑 64 微克/劑 120 劑量/瓶
(Pulmicort nasal aqua.)

☞ 藥品作用



治療過敏所引起的鼻塞及流鼻水症狀。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1~2 次，每次每個鼻孔 1~2 劑。
2. 若對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。並請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記使用，立即補上一個劑量；但若接近下一次使用的時間，在下次用藥時間使用藥物即可。不要為了補錯過的劑量而使用雙倍劑量。
3. 首次使用能舒鼻鼻噴劑前請詳讀隨附的說明書，可要求您的醫師、藥師或呼吸治療師示範正確的鼻噴劑使用技巧，並在他們面前練習。

請依下面步驟使用鼻噴劑：

- (1). 第一次用藥前須作排空，充分搖勻後，對空噴壓藥劑數次，確認有噴出均勻藥霧量之後才能開始使用(如圖一)。
- (2). 吸藥前請先將鼻子擤乾淨。
- (3). 打開瓶蓋並將鼻噴劑搖勻。
- (4). 頭微微前傾或直立。
- (5). 按住一邊鼻孔，並將噴頭放入另一鼻孔，噴嘴微微往外，將藥品壓出至鼻內並輕輕吸氣(如圖二)。
- (6). 由口吐氣後休息一下，重覆步驟 2-5 於另一鼻孔給藥。
- (7). 以乾的面紙擦乾淨噴頭，再蓋回瓶蓋。





注意事項

1. 請依照藥袋指示使用，如果藥袋指示【每次1下】，指的是兩邊鼻孔都各噴1下。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是結核病、疱疹或其他感染。避免與水痘或麻疹患者接觸，因為您較易感染這些疾病。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是過敏及氣喘藥、抗發炎藥(類固醇)。
4. 常見副作用為鼻子刺激或發熱、口乾、頭昏眼花、胃不舒服、咳嗽、聲音沙啞，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：呼吸困難，喉嚨/嘴巴/鼻子內有白斑、鼻出血或鼻痛伴隨頭痛鼻塞、嚴重的痤瘡、臉部水腫。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。

清潔方式

定期清潔上面之塑膠部分。移除棕色保護蓋並向上拔出白色鼻用噴嘴；以溫水清洗塑膠部分。先在空氣中完全陰乾後再蓋回去。