



藥物成分

劑型

編號

Fluticasone

噴霧吸入劑

☞ 藥品商品名及含量

輔舒酮優氟吸入劑 50 微公克/劑量 120 劑量/瓶
(Flixotide Evohaler)


☞ 藥品作用

對肺部具有抗發炎作用，用於預防性治療成人及兒童氣喘。

☞ 使用方式

1. 通常每日2次，每次1-2個劑量。
2. **新的吸入劑第一次使用**或超過一星期未使用之前，請充分振搖吸入劑，並且**對空氣試噴兩下**，以確定它可以使用。


- (1) 輕輕擠壓吸口蓋的兩側並移除吸口蓋。
- (2) 檢查吸入器內外，包含吸口是否乾淨。
- (3) **充分振搖吸入器**並確保內容物已混合均勻。



- (4) 將吸入器直立置於拇指與食指之間，拇指放在底部，亦即吸口的下方。
- (5) **先把氣吐乾淨**(盡可能的呼氣)，然後將吸口置於齒間，緊閉雙唇，但不要咬吸口。




- (6) 開始經口吸氣的同時，立即用食指在吸入器的上方**往下壓一次**以釋出藥劑噴霧，同時仍**保持穩定且深深慢慢的吸氣動作**。





(7) **擤住呼吸並將吸入器移開口部，繼續擤住呼吸**，時間愈久愈好，直到感到不舒服為止（建議最少閉氣5~10秒）。



- (8) 如果需要吸入更多次，則將吸入器繼續保持直立，大約等30秒後再重複步驟 3至步驟 7。
- (9) 之後，**以清水漱口並吐出**。
- (10) 使用後應將吸口蓋壓緊蓋好。

∞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 ritonavir。
3. 不可突然終止輔舒酮優氟吸入劑的治療。
4. 常見副作用為口腔和喉部念珠球菌感染及嘎聲，但在吸入藥劑後立即以水漱口可能可以預防，所以漱口是很重要的。
5. 目前懷孕的安全性資料有限，並缺少哺乳方面的安全性資料，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。

∞ 清潔方式

吸入劑必須至少一個禮拜清潔一次。請勿將金屬罐放入水中。

1. 移開吸口蓋(不要將金屬罐自塑膠外殼中取出)。
2. 以乾布、面紙，或棉布將吸嘴與塑膠外殼之內外擦拭乾淨。
3. 將吸口蓋裝回去。