



<p><b>藥物成分</b></p>	<p><b>劑型</b></p>	<p><b>編號</b></p>
<p><b>Fluticasone/ Salmeterol</b></p>	<p><b>乾粉吸入劑</b></p>	





☞ 藥品商品名及含量

使肺泰250準納乾粉吸入劑 250微克+ 50微克/每劑量  
60劑量/瓶 (Seretide 250 Accuhaler)

☞ 藥品作用

綜合了吸入性類固醇及長效支氣管擴張器，可降低肺部發炎及症狀，長期使用可控制氣喘及慢性阻塞性肺部疾病。

☞ 使用方式

 <p>開啟</p>	<p>一手拿著乾粉吸入器，另一手將拇指置於拇指把手處，將之推至盡頭，打開您的乾粉吸入器。</p>
 <p>推</p>	<p>握著您的乾粉吸入器，吸嘴向著自己，推開釋藥板機直至聽到“喀”一聲，此時即有一次劑量可供使用。</p>
 <p>吸</p>	<p>使用前要先把肺部氣體深深吐掉(不可對著吸嘴吐氣) 然後將吸入劑之吸嘴緊緊含於兩唇之間，並同時盡可能地深深且用力地吸一口氣。 吸完後將吸入劑從嘴唇移開，並閉氣約5~10秒鐘。 再緩慢吐氣後恢復正常呼吸。</p>
 <p>關閉</p>	<p>使用完乾粉吸入器後，可用乾布或衛生紙將吸嘴擦淨(不可用水碰觸吸入器)，並關閉吸入器。 當您關閉乾粉吸入器時，會有“喀”一聲，此時釋藥板機會自動歸回原位並重新設置。 此外請您使用完藥物後務必漱口。</p>



## ∞ 注意事項

1. 對於本藥內所含任一成分過敏者禁止使用。
2. **每次用完後皆要漱口(至少3次)且需漱到喉嚨**，並將漱口水吐掉。若使用者無法漱口，可用紗布沾水擦拭口腔內側3次，以避免聲音嘶啞與口腔念珠球菌感染。
3. **此藥品主要是用於預防氣喘發作，即使沒有症狀也要常規地依照醫師的指示使用，不可突然停藥或自行增量或減量。**病患若有急性發作之可能，應告知醫師並使用其他緩解急性發作之藥物治療。
4. 若醫師指示需吸入2次劑量，請重複上述2-3步驟(間隔30~60秒即可)，不可一次推兩個劑量，本藥有安全保護，不管推幾次把手都只有一次要量可使用。
5. 懷孕分級為C級，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，須由醫師評估臨床風險與好處才能使用；哺乳期嬰兒風險未明，有哺乳需求請事先諮詢醫師/藥師。
6. 藥品內含有乳糖，目的是方便辨識是否有成功吸入藥品。所以在使用時可能會感覺到略有甜味。

## ∞ 清潔方式

使用完乾粉吸入器後，請用乾的面紙或布擦拭吸嘴即可，此外切忌不能用水清洗乾粉吸入器或將乾粉吸入器放於水中。

## ∞ 如何觀測剩餘藥量

新開封藥品每瓶內含有60個劑量，藥物劑量視窗在瓶身旁邊，會呈現數字“60”的字樣，而此數字會隨著每次使用後而遞減。

當藥物劑量視窗出現紅底時，表示乾粉吸入器即將用完，此時應盡速回診就醫。