



## 藥物成分

Clobetasol

## 劑型

外用泡沫液

## 編號

## 药品商品名及含量

可易適泡沫液 0.5 毫克/克 25 毫升  
(Vimax Foaming Solution)


## 药品作用

本品為強力腎上腺皮質類固醇，有抗發炎及血管收縮作用，可治療牛皮癬，頑強的濕疹、扁平苔蘚、盤狀紅斑性狼瘡或用過其他類固醇無理想反應的皮膚病症。

## 使用方式

1. 每日 1~2 次，輕擦於患部。


使用時請握鋁罐，垂直倒立 90 度，按下噴嘴即可順利擠出泡沫慕絲。錯誤握罐方式會讓瓶內氣體外洩，使用一段時間後就無法擠出慕絲。



## \*使用步驟：


## 1. 垂直倒立瓶身拿好：

使用時請直接垂直倒立擠出泡沫液即可，請不要搖晃或震盪瓶身。



## 2. 壓出：

壓出適量泡沫於瓶蓋內，不要直接噴在手上或身體部位，因體溫會讓泡沫溶解成水狀。



## 3. 塗抹：

以手指取適量泡沫塗於患部。

## 4. 乾燥：

塗抹完靜置患部數分鐘即可乾燥，塗藥後請務必清洗雙手，未用完泡沫建議丟棄，患部不須再沖洗。

## 8 注意事項

1. 情況改善後應回診與醫師討論是否停止療程換成較溫和之類固醇控制。
2. 本品除非經醫師指示，否則不能長期使用，治療超過四週後如果沒有再回診，應停止治療。
3. 如果存放地點因溫度過高無法形成泡沫，請放入冰箱**冷藏數分鐘後**再重新使用。
4. 請將泡沫液擠在杯蓋內，再以手指挖取適量泡沫液塗於患處，請勿直接將泡沫液擠於患處，這樣非常容易造成藥物過量。
5. 除非有醫療人員的指示，否則塗藥患部請勿以不透氣的繃帶/敷料覆蓋，也應避免使用其他刺激性的化妝或保養品。
6. 若療程中您懷疑患部有發生感染情形，應立即回診使用適當抗菌療法(本藥無法殺菌或抗黴菌)。
7. 儘可能避免長期持續治療。長期密集使用會造成全身性的吸收、皮膚的局部組織萎縮性變化，如皮膚變薄、產生皺紋及表皮血管的擴張。
8. 若用於孩童，建議應每週複診由醫師確認後再延續使用。
9. 此藥用於孕婦及哺乳婦女的安全性仍未確立，故除非醫師評估使用的益處大過於風險才可使用。

## 9 保存方式

1. **請置於 25°C 以下陰涼處儲存**，勿放在日曬處、浴室、廚房、汽車內等高溫高濕處所。也不可長期放在冰箱，低溫會使內容物油水分離並堵塞噴嘴。
2. 當內容物快用完時，擠出的泡沫液會呈不完整斷續狀，但罐內仍有殘留的液化氣體，請按壓噴嘴排空氣體，空罐可交由垃圾車回收。