



藥物成分	劑型	編號
Rotigotine	貼片	







∞ 藥品商品名及含量

紐普洛穿皮貼片劑 6毫克/24小時 (Neupro Transdermal Patch)

∞ 藥品作用

原發性帕金森氏症症狀治療藥物。

∞ 使用方式 (黏貼部位請見注意事項第1、2點)

	<p>步驟一 抓緊包裝袋兩邊拉開。</p>
	<p>步驟二 將貼片從包裝袋取出。</p>
	<p>步驟三 以雙手抓住貼片，保護膜朝上。</p>
	<p>步驟四 將貼片左右兩邊邊緣往下折，讓保護膜中間S形切線往上翹。</p>
	<p>步驟五 撕掉其中一半保護膜 (勿觸碰貼片黏著表面)。</p>
	<p>步驟六 將露出黏著面的那半邊貼到乾淨皮膚上，然後撕掉另一半保護膜。</p>
	<p>步驟七 以掌心緊貼貼片20至30秒，確認貼片有貼緊皮膚。</p>



∞ 注意事項

1. 應貼於**腹部、大腿、臀部、側腹、肩部或上臂乾淨且無受損的完整皮膚上**。
2. 應**每日輪流替換黏貼部位**，同一黏貼處於**14天內不宜黏貼2次**。
3. 如果忘了在每天原本固定的時間更換貼片，或是貼片失去了黏性而掉落，應在一天中剩下的時間裏換用一張新的貼片(亦需貼在不同的部位)，並在隔天原本固定更換貼片的時間更換新的貼片。
4. 使用貼片後，請**清洗雙手**，確定雙手未沾染殘留藥物，在未洗手前小心不要碰觸眼睛。
5. 移除貼片時，應**小心緩慢的撕除後將貼片對折互黏**，然後妥善丟棄在小孩/寵物無法接觸之處。
6. 本品為外用貼片，請每日更換一片，一片請勿使用超過24小時，**不可進行任何切割、剪裁或破壞**。
7. 黏貼本藥期間可正常淋浴或游泳，但請勿沖刷搓洗貼片。
8. 使用本藥期間可能會**無前兆睡著**，在還沒確定對您有何影響前，請勿開車或操作危險機械，服藥期間也應特別注意。
9. 對亞硫酸鹽(sulfite)過敏者，不應使用本藥。
10. 背膜含鋁，於進行核磁共振造影(MRI)或心臟電擊之前，應告知醫師並移除本藥。
11. 請勿任意停藥，長期使用後若要停藥請務必先與醫師討論。
12. 若為懷孕婦女/準備懷孕/哺乳需求之婦女，請務必告知醫師，請醫師評估您的狀況是否適合用藥。
13. 使用此藥，若有身體不適、嚴重頭暈、視覺改變之狀況，請務必告知醫師。