



藥物成分	劑型	編號
Mometasone	鼻噴劑	

☞ 藥品商品名及含量

內舒拿水溶性鼻用噴液劑 50 微公克/劑量 140 劑量/瓶
(Nasonex Nasal Spray)

☞ 藥品作用

是一種局部使用的糖皮質類固醇。用於成人青少年及二歲以上兒童之季節性或常年性過敏性鼻炎。亦用於治療18歲及以上成人輕度到中度鼻息肉之相關症狀。

☞ 使用方式

 <p>Diagram A</p>	<p>步驟一、拔開防塵蓋。</p>
 <p>Diagram B</p>	<p>步驟二、第一次使用時，以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部往下壓，以將幫浦引流。 壓放幫浦約 6-7 次，直到有均勻的噴霧產生，此時噴霧幫浦已可使用。</p>
<p>步驟三、使用前應充分振搖容器。</p>	
 <p>Diagram C</p>	<p>步驟四、先擤乾淨鼻子。頭部略微向前傾，持瓶身向上，小心將噴頭伸進鼻孔，用另一隻手壓住另一邊鼻孔。 步驟五、以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部充分一次壓到底是一個噴劑量，噴完後請輕輕吸氣。 步驟六、另一邊鼻孔重覆上述動作。 步驟七、將防塵蓋蓋回。</p>



⊗ 注意事項

1. 本藥如果藥袋上指示為【每次1下】，指得是左右鼻孔都需個噴1下。
2. 如果忘記噴藥的話，應該在想起時，立即使用。但是，如果距離下次用藥的時間太近，就應該捨棄此次的藥物，恢復到下次正常用藥的時間，不可一次使用雙倍的劑量。
3. 清潔噴頭時，拔下防塵蓋，輕輕自白色頸部將噴頭拔起，與防塵蓋一起用冷水沖洗。待陰乾後將其裝回原位。
4. 如果已有14天或更久未曾使用，下次使用前應重新引流(重新作一次步驟二)。
5. 對本藥品之成分有過敏者，禁止使用。
6. 常見副作用為頭痛、鼻腔出血、咽頭炎、鼻腔灼傷、鼻腔刺激及鼻潰瘍等狀況，如果副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師。
7. 本藥品可儲存於室溫，避免直接日照或冷凍。
8. 懷孕等級C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。
9. 本藥品因尚無足夠證據顯示授乳期使用是安全的，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。