



藥物成分	劑型	編號
Betamethasone/ Calcipotriol	外用 凝膠	

☞ 藥品商品名及含量

絲玫歐凝膠 0.5 毫克/0.05 毫克/克 (Xamiol Gel)

☞ 藥品作用

維生素D衍生物物-誘導角質細胞的分化及抑制其增生，糖皮質類固醇-具有抗發炎、止癢、使血管收縮和抑制免疫功能，可治療尋常性牛皮癬

☞ 服用方式

1. 通常每天一次局部塗抹於患處，建議治療為四週
2. 請依照以下步驟使用絲玫歐凝膠。

使用步驟	藥品外觀
1. 使用前將瓶子搖一搖	
2. 使用 Xamiol® Gel 前,請先將頭髮分邊	
3. 將 Xamiol® Gel 塗抹於頭皮上受牛皮癬感染之患處	

4. 輕輕用指尖按摩塗佈 Xamiol® Gel 於患處。



5. 使用後不要立刻洗頭髮。Xamiol® Gel 在夜間或日間都應該留在頭皮上。

3. 請依照醫師指示塗抹，不可自行調整劑量或增加塗抹次數。若不慎忘記塗抹，請立即塗抹，但若已接近下一次塗抹時間，在下次用藥時間塗抹即可，不可為了補塗而塗抹雙倍劑量。

∞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是鈣離子失調、皮膚之病毒性損傷(例如泡疹或水痘)、真菌或細菌的皮膚感染，寄生蟲感染，肺結核或梅毒之皮膚表現等有關的皮膚症狀以及肛門和生殖器搔癢症、罹患嚴重的腎功能不全或嚴重的肝功能不全。
2. 本品對臉部皮膚有刺激性，不可使用於臉部，且建議使用後將手洗乾淨。
3. 請室溫儲存，避免陽光直射，開封後可使用三個月。
4. 常見副作用為搔癢、皮疹、皮膚灼熱感，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：**高血鈣症狀(多尿、便秘、肌肉無力、混淆及昏迷)**。
6. 目前沒有足夠資料顯示，此藥對人類的潛在風險仍是不確定的，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，**本藥分泌到母乳的量不明**，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。