

藥物成分	劑型	編號
<b>Triamcinolone</b>	<b>鼻噴劑</b>	

### ☞ 藥品商品名及含量

特索寧水性鼻用噴液劑 55 微克/次 120 次/瓶

(Trisonin nasal spray)

拿塞可得鼻用噴液劑 55 微克/次 120 次/瓶

(Nasacort nasal spray)

### ☞ 藥品作用


鼻用類固醇，可抗過敏反應，用來治療成人之季節性及經年性過敏性鼻炎。

### ☞ 使用方式

1. 每次使用前，須先將本品充分搖勻。
2. **第一次用藥前**，充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑至少5次，以確保噴出之均勻的藥霧。如果噴藥間隔時間超過2星期，使用前請再重覆上述動作，惟只需對空噴壓一次即可。(如圖示一)
3. 輕擤鼻子，將鼻孔清理乾淨。
4. 取下保護蓋及拉開扣環(在按壓處的側邊)，以拇指頂住瓶底，以食指和中指夾住瓶頸之環座。
5. 頭微微前傾，將噴頭置入一側鼻孔中(噴頭微微向外)。
6. 手指壓住另一側鼻孔，用指力快速壓下噴頭，使噴鼻液成霧狀噴出，同時緩緩深吸氣，將噴鼻液吸入鼻腔內，然後自口部慢慢呼氣。在另一鼻孔重複相同步驟。(如圖示二)
7. 使用完畢，將噴頭輕拭乾淨，蓋回保護蓋，妥善保存。



圖一



圖二



## ☞ 注意事項

1. 鼻用，通常每日 1 次，每次兩邊鼻孔各噴 1~2 下。
2. 如果藥袋指示【每次 1 下】，指的是兩邊鼻孔都各噴 1 下。
3. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是鼻中膈潰瘍、鼻科手術、鼻子外傷、白內障、青光眼。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是輪狀口服疫苗、近期準備接種活性疫苗或口服類固醇。
5. 常見副作用為鼻腔刺激、黏膜乾燥、頭痛、鼻炎、咽喉炎、鼻竇充血與打噴嚏，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：過敏反應(皮疹、蕁麻疹、口腔破皮脹痛)、鼻中膈穿孔(鼻塞/鼻水/鼻血合併頭痛不適)、青光眼、白內障。
7. 長時間高劑量使用類固醇鼻用製劑可能造成全身性作用。
8. 目前對胎兒的風險不明，資料顯示動物實驗中有致畸胎風險，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，服藥期間不建議哺乳。

## ☞ 清潔方式

1. 拿掉瓶蓋與噴嘴。
2. 將噴嘴與瓶蓋以溫水浸泡數分鐘，然後在水龍頭下沖洗。
3. 將水甩乾並陰乾。
4. 重新試壓直至微細噴霧狀產生且可正常使用為止。
5. 若噴霧劑無法操作時，可能是因為噴嘴阻塞，請勿嘗試以針頭或其他尖銳物品將噴嘴口弄大，而破壞噴霧器的裝置。

## ☞ 保存方式

25°C 以下及兒童伸手不及之處，開瓶兩個月後請丟棄不用。