



**藥物成分**  
**Estrogen  
Conjugated**

**劑型**  
**陰道藥膏**

**編號**

## ☞ 藥品商品名及含量

普立馬林陰道藥膏 0.625 毫克/克 14 公克/支  
(Premarin Vaginal cream)

## ☞ 藥品作用

此藥為一荷爾蒙製劑，主要用來減緩停經有關的症狀如萎縮性陰道炎及更年期性外陰萎縮症。

## ☞ 服用方式

依照醫師指示使用劑量；如果您是每天使用一次，最好在晚上洗完澡睡前使用。請遵循以下的步驟及指示用藥：

1. 打開軟膏管蓋子，將塗藥器拴緊在軟膏上
2. 依所需劑量將藥膏充填到塗藥器內。
3. 躺平後雙膝向上彎曲並雙腿分開。
4. 輕輕的將塗藥器置入陰道內，推動推管將藥品擠入陰道內。
5. 使用後將推管與容器管分開，用少許的肥皂和溫水沖洗，勿用熱水。
6. 使用前後皆須洗淨雙手。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是對雌激素過敏、惡性腫瘤(乳癌、婦科癌症)、深層靜脈血栓塞、肺栓塞、動脈栓塞(如中風、心肌梗塞)、肝功能異常。
2. 限陰道用，且不可在性交時作為潤滑使用。
3. 使用過量可能有使用部位不適、噁心、嘔吐、腹痛等現象。
4. **如果有下列症狀，請盡速回診：乳房脹痛、陰部異常搔癢、不尋常的分泌物或出血、嚴重頭痛/噁心。**
5. 請儲存於室溫20-25°C 乾燥陰涼之處。
6. 懷孕等級X，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，亦可能會降低乳汁分泌量，服藥期間不建議哺乳。