



藥物成分	劑型	編號
Ofloxacin	耳滴劑	

☞ 藥品商品名及含量

泰利必妥點耳液 3 毫克/毫升 5 毫升/瓶 (Tarivid Otic)


☞ 藥品作用

本品為外用性藥水，用於治療外耳炎、成人及青少年鼓膜穿孔之慢性中耳炎、裝有鼓膜造口管之小兒急性中耳炎。

☞ 使用方式

瓶蓋開啟方式：

1. 如圖所示，請依照箭頭①所示方向扭轉，以打開耳滴劑之開口。
2. 接著往相反方向扭轉，(如箭頭②所示)，以打開瓶蓋。



耳滴劑使用說明：


1. 用肥皂及清水清洗雙手。
2. 用濕的面巾清潔耳朵，再將耳朵擦乾。
3. 將藥劑輕輕滾動或輕握數秒，使藥液溫度接近體溫，減少對耳朵的刺激。
4. 耳滴劑使用前須充分振搖。



5. 側躺或頭傾斜使受感染耳側朝上。
6. 成人可將耳葉拉向後上方，小孩則拉向後下方，使耳道變直。
7. 滴入適量藥劑，保持耳部朝上使藥液流入。



8. 藥劑滴入後，輕拉耳朵或輕壓耳珠，使氣泡跑出。
9. 保持耳部朝上，讓藥劑停留約 5 至 10 分鐘後，再讓它自然流出，以紙巾擦拭留出藥液。
10. 用肥皂及清水清潔雙手。





## 注意事項

1. 通常每日使用 2 次，每次 6~10 滴。劑量依疾病嚴重度及個別反應不同，**必須遵照醫師指示常規用藥，不可自行更改劑量或自行停藥。**
2. 使用時應避免接觸到滴管頭而造成污染，以保持藥液的清  
潔。
3. 儲存方法：**室溫保存，不可置於冰箱內冷藏，避免給藥後造成暈眩不適**；開瓶後，保存期限為六個月，若外觀出現異常變化請勿使用。
4. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病。
5. 常見副作用為耳朵疼痛、頭痛、暈眩、嘴內有苦味，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. **如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚發疹、過敏反應、聽力異常等。**