



藥物成分	劑型	編號
Imiquimod	外用藥膏	

## ☞ 藥品商品名及含量

樂得美乳膏 5% 250 毫克/小包 12 小包/盒 (Aldara Cream)

## ☞ 藥品作用

本藥為外用，用來治療生殖器外部及肛門周圍的尖性濕疣。

## ☞ 服用方式

1. 一般成人常用劑量為**每週使用 3 次**，可固定周一、三、五或周二、四、六，**睡前**塗抹。
2. 使用前請將雙手洗淨，將乳膏薄薄塗於未破皮發炎的疣患處，輕輕按摩，直至乳膏完全滲透。**擦完藥後請以肥皂清洗雙手**，並讓藥膏停留患處約 6-10 小時，隔日早上再以肥皂和清水潔淨患處。請小心藥膏不要碰觸到眼睛。
3. 整個療程可至病灶消除或至多 16 周為止。請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加用藥次數。若不慎忘記，請立即補擦，但若已接近下一次時間，在下次擦藥時間使用即可。

## ☞ 注意事項

1. **本藥會加重原有的皮膚發炎反應，若生殖器官有皮膚炎、傷口或外科術後患部組織未痊癒前，並不建議使用本品。**
2. 本藥不建議用於治療肛門、陰道或尿道內的疣患。
3. 抹藥後，除非醫師指示，**勿以緊密繃帶或敷料覆蓋疣患**，可使用非密封材質的綿紗布或寬鬆綿內褲。
4. 塗抹後須減少暴露於自然或人工光源下，並做好防曬措施。
5. 本藥**無法防止疣傳染**，治療期應避免性交/肛交或口交。
6. 常見副作用為輕微的皮膚燒灼感、紅腫、疼痛、紅疹、脫皮，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 未割包皮的男性患者，若疣長在包皮下，應每天掀起清潔，否則可能引起**包皮繃緊**，早期症狀有包皮腫脹、破皮或難於掀起，若出現上述情況，應**立即停藥並回診**。
8. **如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚癢、起水泡、結痂、紅腫、鱗癬、虛弱、躁動、類似感冒症狀(包括腹瀉、疲倦、發燒、頭痛、肌肉痛)。**
9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。本藥分泌到母乳的量不明，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。