



<b>藥物成分</b>	<b>劑型</b>	<b>編號</b>
<b>Rivastigmine</b>	<b>貼片</b>	

**藥品商品名及含量**




- 憶思能穿皮貼片(5cm<sup>2</sup>)9 毫克/片 (Exelon Patch 5)
- 憶思能穿皮貼片(10cm<sup>2</sup>)18 毫克/片 (Exelon Patch 10)

**藥品作用**


本藥用於治療輕度至中度阿滋海默氏病之癡呆(失智)症。

**使用方式**

- 通常每日 1 次，每次 1 片。每天於固定時間更換新的貼片。
- 應貼在乾淨、乾燥、無毛且無發紅、刺激疼痛、燒傷或割傷的健康皮膚上。
- 黏貼部位應輪流替換以減少皮膚刺激性，相同的部位在 14 天內不可重覆黏貼，可事先規劃黏貼部位的順序。
- 如果忘記用藥時，應立即貼上新的貼片，到了隔天的給藥時間，再換貼另一片貼片，不可同時貼二片來補償忘記貼的劑量。

使用步驟	圖示
1. 沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片。 <b>貼片不可裁剪或折疊。</b>	
2. 貼片的黏性面(接觸面)覆蓋有保護襯片。將保護襯片的一邊剝開。 <b>手指不要碰觸貼片的黏性面。</b>	
3. 將貼片的黏性面貼在上或下背部、上臂或胸部。 <b>可選擇的區域如右圖所示</b>	<p style="text-align: center;">每天在以下各部位中擇一貼上一片貼片</p> 

4. 將保護襯片的另一邊剝開。



5. 用手掌按緊貼片至少 30 秒，確保各邊緊密黏附。

可用原子筆在貼片上寫下日期。

6. 貼完貼片請用肥皂洗手。



### 摘除：

到了隔日要貼新的貼片前再撕下舊的貼片，撕下的貼片應對折貼好放回原本包裝內再丟棄，注意須避免幼兒/寵物碰觸。

即使過了 24 小時，貼片上仍可能有藥量殘留，請避免接觸到眼睛，並在摘除貼片後用肥皂洗手。

### ⊗ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重呼吸道疾病、心律不整、排尿困難、震顫、肝功能障礙。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是抗膽鹼藥、metoclopramide、 $\beta$ -blocker、oxybutinin、tolterodine。
3. 請勿吸菸，吸菸會降低這個藥的藥效。
4. 避免將貼片長時間曝露在外部的熱源(過度日曬、三溫暖、日光浴)。
5. 若貼片脫落無法再貼回時，請立即貼上新的貼片，隔天再於原本預定換藥的時間再換一片新的貼片。
6. 常見副作用為噁心、嘔吐、腹瀉、食慾減低、疲倦、頭暈，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
7. 如果有下列症狀，請立刻就醫：皮膚過敏反應（搔癢、發熱、蕁麻疹）、胃出血、排尿困難、癲癇、震顫、心跳不規則、視力變化。
8. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，由於尚未建立授哺乳期間使用資料，不建議用於哺乳期間。