



藥物成分	劑型	編號
Insulin NPH	針劑	

☞ 藥品商品名及含量 (國際單位=International unit, IU)

因速來達胰島素注射液

100 國際單位/毫升 10 毫升/瓶 (Insulatard)

優泌林-中效型人體胰島素(基因重組)懸液

100 國際單位/毫升 10 毫升/瓶 (Humulin N)



☞ 藥品作用

第一型或第二型糖尿病。

☞ 服用方式

1. 一天一次，只能皮下注射。
2. 確認使用的注射針筒有適當的單位刻度。
3. 使用前務必須將藥品放在手掌間滾動，直到混合均勻(白色混濁狀)。
4. 以針筒抽取與要注射的胰島素劑量相等體積的空氣，注入藥瓶。再抽取本次應注射的用量。
5. 注射胰島素於皮下且讓針頭停留於皮下至少 6 秒再拔出，以確定胰島素都已完全注射。



☞ 注意事項

1. 未開封需 2-8°C 冷藏，開封使用後可在 30°C 以下保存 4 週。不可冷凍及加熱回溫。
2. 戳針取藥前及施打前都請以酒精棉片消毒藥瓶橡膠蓋及施打部位。
3. 施打過程出現任何問題，請聯絡糖尿病衛教室/藥物諮詢。
4. 使用胰島素可能導致**低血糖**的副作用，請記得索取**低血糖衛教單張**。
5. 若施打部位**嚴重紅腫/疼痛**，或施打後出現**嚴重腹痛(可能合併噁心)**、**皮疹**、**頸部腫塊**、**聲音啞嚥**下困難或**呼吸困難**，請立即停藥且回診。