



藥物成分

劑型

編號

**Empagliflozin**  
**Metformin**

口服藥

## ☞ 藥品商品名及含量

恩美糖膜衣錠 12.5 毫克+850 毫克/錠 (Jardiance Duo)

## ☞ 藥品作用

適用於單用 metformin 或 empagliflozin 時血糖控制不佳，或早已同時接受 metformin 和 empagliflozin 合併治療而狀況穩定者的第二型糖尿病成人病人，做為改善血糖之輔助治療。

## ☞ 服用方式

1. 每日 2 次，每次 1 粒。建議隨餐使用。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。不慎忘記服藥請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告知醫師或藥師是否有藥物過敏或其他疾病，特別是中重度腎功能不全、末期腎病、透析病人、急慢性酸中毒包括糖尿病酮酸中毒。
2. 請告知醫師或藥師是否有在服用其他藥物，特別是利尿劑、糖尿病促敏劑、胰島素。
3. 請勿飲用酒類，酒類會加劇 metformin 對乳酸代謝的效果。
4. 常見副作用為腸胃不適、暈眩、嘔吐、低血糖、泌尿道感染、排尿增加、低血壓，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：  
乳酸中毒、酮酸中毒(過度換氣、肌肉痛、嗜睡)、嚴重泌尿道感染(生殖器部位紅腫熱痛)、過敏反應(蕁麻疹)、急性腎臟損傷(嘔吐、過度熱曝露)。
6. 女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，不建議懷孕第二和第三孕期間使用本藥，另服藥期間也不建議哺乳。