



藥物成分

劑型

編號

L-Isoleucine

口服藥

L-Leucine

L-Valine

☞ 藥品商品名及含量

胺舒靈懸浮液 20 克/包 (Licure Suspension)

☞ 藥品作用

支鏈胺基酸之營養補給

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，每次 1 包。
2. 服藥時，還需另補充必須蛋白質(氨基酸量)與熱量。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。不慎忘記服藥請立即補服，若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是先天性代謝缺陷的人，特別是支鏈胺基酸代謝異常，例如楓糖尿症、異戊酸血症等。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 Madopar、Sinemet。
3. 請勿長期或過量使用，因為可能會引起生化檢驗值異常，例如：血中尿素氮或血清氨上升。
4. 常見副作用為腸胃不適、打嗝、口渴、皮疹、搔癢、臉部或下肢水腫，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀，請立刻就醫：代謝功能異常(如血氨增加)、腎功能異常、肝功能異常。
6. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥可能會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。