



藥物成分

劑型

編號

**Glecaprevir/
Pibrentasvir**

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

艾百樂膜衣錠 100 毫克/40 毫克 (Maviret)

☞ 藥品作用

Maviret 是 glecaprevir 和 pibrentasvir 固定劑量複方製劑，兩種成分都是直接作用於 C 型肝炎病毒的抗病毒藥物。

☞ 服用方式

1. 每日 1 次，每次隨餐服用 3 粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是曾經感染 B 型肝炎病毒，或有 C 型肝炎以外的肝臟疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是 atazanavir 製劑、simvastatin、dabigatran etexilate、含 ethinyl estradiol 製劑、rifampicin、carbamazepine、efavirenz 和金絲桃草。
3. 常見副作用為頭痛、倦怠和噁心，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 如果您曾經感染 B 型肝炎病毒，在接受 Maviret 治療 C 型肝炎病毒期間或完成治療後，B 型肝炎病毒有可能再度活化。B 型肝炎病毒再度活化可能導致嚴重的肝臟問題，包括肝衰竭甚至死亡。如果您有 B 型肝炎病毒再度活化的風險，醫護人員在您接受 Maviret 治療期間或完成治療後，會進行監測。
5. 目前尚不清楚 Maviret 是否會傷害未出生的胎兒。女性計

臺北市立

畫懷孕或已懷孕請告知醫師。

6. 目前尚不清楚 Maviret 的成分是否會分泌至人類乳汁中、
影響母乳分泌或哺乳的嬰兒。有需要哺乳請事先諮詢醫師/
藥師。