



藥物成分

劑型

編號

Aripiprazole

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

安怡美錠 20 毫克/錠(Abimay)

大塚安立復錠 15 毫克/錠(Abilify)

大塚安立復錠 5 毫克/錠(Abilify)

☞ 藥品作用

成人和青少年(13 至 17 歲)的思覺失調症。

☞ 服用方式

1. 通常每日 1 次，可空腹或隨餐服用。
2. 請遵照醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或服藥次數。
3. 若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對此或其他藥物有過敏反應。
2. 請告訴醫師或藥師，您目前正在服用的藥物(包含非處方藥)或過去兩星期所服用的藥物，特別是 CYP3A4 誘導劑(如 carbamazepine)，CYP3A4 抑制劑(如 ketoconazole 或 clarithromycin)，CYP2D6 抑制作用的藥物(如 quinidine、fluoxetine 或 paroxetine)以及降血壓藥。
3. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：心血管疾病(心肌梗塞、缺血性心臟病、心臟衰竭或傳導異常之病史)，腦血管疾病，癲癇，糖尿病或失智症等。
4. 服用此藥期間請勿飲酒。
5. 常見副作用為噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮及失眠之不良反應，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：心跳加速或不規則、排尿困難、呼吸困難、肌肉僵直、不正常瘀傷或出血等。
7. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。服用本藥期間應避免母乳哺育，有需要請事先諮詢醫師/藥師。