



藥物成分	劑型	編號
<b>Potassium/Citrate Monohydrate / Citric Acid</b>	<b>口服 粉劑</b>	

## ☞ 藥品商品名及含量

結石清顆粒 660 毫克+200.4 毫克/克 5 克/包 (K-Citrate)  
"派頓"淨石顆粒 3300mg +1002 毫克/克 5 克/包 (Crashtone  
Granules "Patron")

## ☞ 藥品作用

鹼化劑(用於須長期保持尿鹼性之尿道結石、腎小管性酸毒症)

## ☞ 服用方式

1. 通常每日 3 次，每次 1 包。
2. 單劑量包裝之內容物加入 180ml 冷開水或果汁中混合均勻後服用。
3. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

## ☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是嚴重腎臟疾病伴隨尿少症。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是含鉀藥物、保鉀利尿劑、強心配糖體等。
3. 請飯後服用，以避免胃腸不適，如：腹瀉。
4. 常見副作用為肌肉無力、噁心、心律不整，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
5. 如果有下列症狀：心律不整、失去知覺，請立刻就醫。
6. 懷孕等級 C，目前對胎兒的風險不明，臨床資料不足，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師；若有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。