



藥物成分

劑型

編號

Cyclobenzaprine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

服樂適持續性釋放膜衣錠 15 毫克/錠(Flexer ER)

☞ 藥品作用

緩解急性骨骼肌肌肉之痙攣。本品應該短期使用，因為急性骨骼肌疼痛引起之肌肉痙攣也多是短期間的症狀。

☞ 服用方式

1. 成人建議劑量為每日 1 次，每次 1 粒(15mg)。某些病患可能需要每日 1 次，每次 2 粒(30mg)。
2. 請依醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是本品禁用於心肌梗塞急性恢復期、心律不整的病患、心臟傳導阻滯或鬱血性心衰竭、甲狀腺功能亢進。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物，特別是與 monoamine oxidase(MAO)抑制劑併服，或者於 MAO 抑制劑停藥後 14 天內服用，可能造成高熱危象發作及死亡。
3. 常見副作用為口乾、頭暈、嗜睡，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 本品與任何有血清素效應的藥劑併用會有潛在危及生命的血清素症候群，如果有下列症狀，請立刻就醫：混亂、躁動、發汗、心搏過速、血壓不穩、顫抖、反射亢進、陣攣。
5. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥是否分泌致人類乳汁尚屬未知，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。