

藥物成分

劑型

編號

Amlodipine/
Atorvastatin

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

脂脈優膜衣錠 5 毫克+20 毫克/錠 (Caduet F.C.)

☞ 藥品作用

本藥為複方劑型，針對病人診斷為高血壓或心絞痛同時有血脂異常的心血管合併症治療；能降低相關疾病如中風、心肌梗塞的風險。

☞ 服用方式

1. 通常為每天一次，每次一粒。
2. 請依照醫師指示服藥，不可自行調整劑量或增加服藥次數。若不慎忘記服藥，請立即補服，但若已接近下一次服藥時間，在下次用藥時間服藥即可，不可為了補吃而服用雙倍劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或有其他疾病，特別是肝臟或腎臟方面的疾病。
2. 請告訴醫師或藥師您是否有在服用其他藥物或健康食品，特別是抗凝血藥 warfarin、cyclosporine、erythromycin、HIV 藥物、itraconazole、或其他心血管用藥。
3. 服藥期間請避免飲酒及服用大量葡萄柚或葡萄柚汁。
4. 本藥可能會影響血糖控制，使用期間請注意血糖的變化。
5. 此類藥品副作用相當少見，但有可能發生：暈眩、姿勢性低血壓、周邊水腫、腸胃不適、便秘或腹瀉、肌肉或關節痠痛，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
6. 如果有下列症狀，請立刻就醫：若出現眼睛/皮膚變黃、茶色尿液(黃疸)、右上腹疼痛、不明原因的肌肉疼痛、肌肉無力或痙攣，尤其伴有全身不適、虛弱或發燒的現象。
7. 懷孕等級 X，女性計畫懷孕或已懷孕請先告知醫師；服藥期間不可哺餵母乳，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。