



藥物成分

劑型

編號

Quetiapine

口服藥

☞ 藥品商品名及含量

思樂康膜衣錠25毫克/錠(Seroquel)

腦樂靜膜衣錠25毫克/錠(Neuroquel)

☞ 藥品作用


Quetiapine用於治療思覺失調症與雙極性疾患之躁症發作。此藥也可能用於治療其他病症，詢問您的醫師或藥師以獲得更多相關資訊。

☞ 服用方式

1. Quetiapine 是口服錠劑，與食物併服或空腹服用皆可。
2. 請遵照醫師指示服藥，如果對此藥有任何疑問，應詢問醫師或藥師。未經醫師指示不可自行調整劑量或增加服藥次數。
3. 在服用較大劑量一段時間後，不要沒知會醫生就自行停藥，您的醫師將會依照您的情形調整劑量。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師，您是否對此藥或其他藥物有過敏反應。將以下這些藥加入警訊表中，並告訴醫師或藥師您正在服用的藥物(包含非處方藥)或過去兩星期所服用的藥物，特別是 carbamazepine、phenylbutazone、saquinavir、troglitazone、primidone、sodium valproate、azole 類抗黴菌藥、三環類抗抑鬱藥、巨環類抗生素、thioridazine、phenytoin 或與其他肝臟酵素誘導劑(barbiturates、rifampicin)、降血壓藥、抗憂鬱藥及鎮定劑。
2. 請告訴醫師或藥師，您目前或曾有過的疾病，如：阿茲海默症、乳癌、心血管疾病、糖尿病、肝疾、甲狀腺疾病、有中風或癲癇病史等。
3. 您必須知道這個藥可能會導致暈眩，尤其是突然起床站立時，因此變換姿勢時應減慢動作。在您未清楚藥物可能對您造成影響前，不要開車或操作危險機械。

- 
4. 服用此藥可能會減少出汗，皮膚調節溫度的能力變差。假如體溫過高，可能會中暑。當您在高溫氣候或運動時，請小心不要讓體溫過高。
 5. 酒精會加重此藥所導致的嗜睡作用，服用此藥期間請勿飲酒。
 6. 服藥期間，請定期回診作眼科白內障檢查。定期監測體重、血糖。
 7. 常見副作用為嗜睡、眩暈、體重增加、便秘、低血壓、心跳加快，若症狀惡化且無法忍受請回診。
 8. 如果有下列症狀，請立刻就醫：高燒不退、肌肉僵硬疼痛、出汗多、心跳急促或不規則、舌頭、嘴唇或下巴不自主的運動、肌肉急速抖動或痙攣、昏倒。
 9. 懷孕等級 C，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師，本藥會分泌到母乳裡，有需要哺乳請事先諮詢醫師/藥師。