



藥物成分

劑型

編號

**Picosulfate
Sodium**

口服粉劑

☞ 藥品商品名及含量

保可淨散劑 16.2 公克/包 (Bowklean Powder)

☞ 藥品作用

大腸鏡檢查、腸道、腹腔手術前進行清腸用。

☞ 服用方式

1. 通常於鏡檢/術前使用，配製成的溶液以口服投予。每包須以 150 毫升冷開水泡製成溶液，攪拌 5 分鐘至粉末完全溶解。保可淨散劑已含矯味劑成分，故不須另外添加矯味劑。
2. 進行大腸鏡檢查一般使用 2 包藥粉：第 1 包藥粉應於檢查前一日晚上 5-6 點開始服用，服藥 1 小時後，每 30 分鐘喝 1 杯 250 毫升的水，總共應服用 5-8 杯水；第 2 包於檢查當日使用，檢查前 3 小時禁止喝水，上午檢查者於當日早上 5-6 點服用，服藥 30 分鐘後，開始補充總共 500 毫升的水；下午檢查者於當日早上 8-9 點服用，服藥 30 分鐘後，開始補充總共 1000 毫升的水。
3. 保可淨散劑一般於服藥後 2 小時開始排便。
4. 請依照指示服藥，否則您的檢查可能會失敗而必須重做。

☞ 注意事項

1. 請告訴醫師或藥師您是否有藥物過敏或是有其他疾病，特別是腸胃道阻塞、腸穿孔、腎功能嚴重下降等。
2. 大腸鏡檢查三日前應進行低渣飲食，開始服用保可淨散劑前 1 小時內服下的口服藥品可能會無法完全吸收。
3. 常見副作用為噁心、腹脹、腹痛、嘔吐，但一般都不嚴重，若症狀惡化且無法忍受請回診。
4. 高血壓患者檢查當日照常服用血壓藥；糖尿病患者檢查前一日停止服用降血糖藥；服用抗凝血劑根據藥品不同停藥時間不同，應與醫師或藥師確認停藥天數。
5. 懷孕等級 B，女性計畫懷孕或已懷孕請告知醫師。